

PROTOCOLO ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN RESIDENCIAS VACUNADAS

Documento técnico
Actualización 7 de Mayo de 2021

En residentes, vacunados o no vacunados, pueden aparecer signos y síntomas compatibles con COVID como fiebre, fatiga, tos, dolor de cabeza, diarrea, mialgias, artralgias, deterioro del estado general, pérdida de olfato y/o gusto, etc.

Las recomendaciones generales son:


- 1- Todos los residentes sintomáticos deben ser evaluados para descartar infección activa por SARS-CoV-2 independientemente de que estén o no vacunados
- 2- Mientras se completa la evaluación:
 - a. El residente afectado debe ser aislado en habitación individual y que use, si es posible, mascarilla
 - b. Los profesionales que lo atiendan deben llevar equipos de protección individual completos y extremar las medidas de distancia, uso de mascarilla FFP2 y lavado de manos
 - c. Los residentes potenciales contactos estrechos mantendrán sus actividades normales excepto visitas de familiares o salidas del centro
- 3- Se realizará un **TEST DE ANTÍGENO** inmediatamente:
 - a. Si el resultado del **test de antígeno es negativo**:
 - i. Alta y vida normal salvo que persistan síntomas
 - ii. Con síntomas típicos y persistentes (>48H): se solicitará a CORECAAS una **PCR** manteniendo todas las medidas hasta su resultado
 - b. Si el resultado del **test de antígeno es positivo**: se solicitará **PCR** de confirmación
- 4- Si ha sido necesario realizar **PCR** (casos 3.a.ii. y 3.b.)
 - a. Si el **resultado es negativo**:
 - i. Descartar otras causas de la sintomatología no COVID
 - ii. Si persiste sospecha clínica, se mantendrán medidas de aislamiento con repetición de la PCR a las 48-72h. Si la PCR persiste negativa, alta y vida normal
 - b. Si el **resultado es positivo**:
 - i. Actuaciones con el residente: valorar lo siguiente
 1. Si COVID-19 pasado y cuando (tiene serología?)
 2. Estado vacunal
 3. CT de la PCR(Algoritmo síntomas sugestivos de COVID-19 en residentes vacunados/no vacunados)

- ii. **Actuaciones con la residencia (ver algoritmo): Si se solicita finalmente PCR a residentes y trabajadores**
1. Si aparecen más casos PCR positivo entre los residentes contactos estrecho: actuar conforme a protocolo
 2. Si no aparecen más casos PCR positivos entre los contactos estrechos:
 - a. Mantener cuarentena 10 días del grupo burbuja en zona de aislamiento con PCR repetida a los 7 días
 - b. Pueden seguir con actividades habituales, suspendiendo visitas familiares y salidas


En profesionales, vacunados o no vacunados, pueden aparecer signos y síntomas compatibles con COVID como fiebre, fatiga, tos, dolor de cabeza, diarrea, mialgias, artralgias, deterioro del estado general, pérdida de olfato y/o gusto, etc.


Las recomendaciones generales son:

- 1- Todos los profesionales sintomáticos deben ser evaluados para descartar infección activa por SARS-CoV-2 independientemente de que estén o no vacunados
- 2- Dependiendo del acceso a test de antígeno:
 - a. Si hay acceso a prueba de antígeno, realizar la prueba:
 - i. Si el resultado del test de antígeno es negativo:
 1. Con síntomas atípicos y/o no persistentes:
 - a. Contactar con médico de familia para seguimiento
 - b. Nuestra recomendación es que sea alta y realice vida normal
 2. Con síntomas típicos:
 - a. Contactar con médico de familia para seguimiento
 - b. Nuestra recomendación es mantener medidas de aislamiento 72 horas con repetición del test de antígeno al final del periodo. Si persiste negativo, alta y vida normal
 - ii. Si el resultado del test de antígeno es positivo:
 1. Actuaciones con el profesional:
 - a. Aislamiento domiciliario
 - b. Contactar con médico de familia
 2. Actuaciones con la residencia (ver algoritmo)
 - b. Si no hay acceso a test de antígeno:
 - i. Aislamiento en domicilio
 - ii. Consultar con su médico de familia









TRABAJADOR POSITIVO

Establecer GRUPO BURBUJA:
Cuarentena del grupo en zona de
aislamiento 7 días y alta fin de aislamiento
a los 7 días
Pueden mantener actividades habituales
en espacio físico donde se ubique el grupo
NO requieren aislamiento en habitaciones
Suspender visitas y salidas
NIVEL DE PROTECCIÓN VERDE

**Mantener actividad habitual
del resto de usuarios en el
centro**

**Mantener vigilancia estrecha de síntomas
y realizar TEST DE ANTÍGENOS en
caso de aparición de estos.**

**VER ALGORITMO DE SINTOMAS
SUGESTIVOS COVID-19 EN
USUARIOS VACUNADOS/NO
VACUNADOS**